

坤净栓说明书

Kun jing shuan

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

本品含呋喃唑酮，对本药过敏者禁用，孕妇及哺乳期妇女禁用。

【药品名称】

通用名称:坤净栓

汉语拼音:Kunjing Shuan

【成份】

聚乙二醇、呋喃唑酮

【性状】

本品为黄褐色至褐色鱼雷形栓剂，弹性。

【功能主治】

清热燥湿，去腐生肌，用于湿热下注之阴道炎、宫颈糜烂、宫颈炎等。

【规格】

每粒重3g(含呋喃唑酮50mg)

【用法用量】

阴道给药，一次1粒，一日1次，连用五至七日为一疗程。本品要求在20℃以下贮藏，如温度过高致栓粒变软、变形时，应在使用前放冰箱冷藏，取出后继续使用，不影响疗效。

【不良反应】

尚不明确。

【禁忌】

1、对本药和其它硝基呋喃类药物过敏者禁用。

2、孕妇及哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

本品为中西复方制剂，鉴于尚无充分的临床研究数据证实本复方制剂可以减低或消除其中化学药物呋喃唑酮的不良作用，因此应谨慎使用。在此罗列口服所含化学药物呋喃唑酮的相关内容，以提示医生和患者在使用本品时予以关注。

1、一般不宜用于溃疡病或支气管哮喘。

2、口服呋喃唑酮期间饮酒可引起双硫仑样反应，表现为发绀、头痛、发热、头痛、恶心、腹痛、心动过速、血压升高、胸闷、烦躁等，故服药期间和停药后5天内，禁止饮酒。

3、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6PD)缺乏者可致溶血性贫血。

4、本品含有呋喃唑酮，以下为单独使用该化学药物时的不良反应：主要有恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕、药物热、皮疹、肛门瘙痒、哮喘、直立性低血压、低血糖、肺水肿等，偶可出现溶血性贫血及多发性神经炎。

5、本品含呋喃唑酮，以下均为该化学药物与其它药物同时使用时相互作用：

(1)与三环类抗抑郁药合用可引起急性中毒性精神病，应予避免。

(2)本品可增强左旋多巴的作用。

(3)拟交感胺、富含酪胺食物、单胺氧化酶抑制剂等可增强本品作用。

【贮藏】

密封，置阴凉(不超过20℃)干燥处。

【包装】

聚氯乙烯/纸塑复合袋铝塑包装，每盒1粒(含1粒)。

【有效期】

24个月

【执行标准】

国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-033971-98-2017

【批准文号】

国药准字Z20054904

【药品上市许可持有人】

名称:亚宝药业四川制药有限公司

注册地址:四川省彭州工业开发区柏江北路368号

【生产企业】

企业名称:亚宝药业四川制药有限公司

生产地址:四川省彭州工业开发区柏江北路368号

邮政编码:611930

电话号码:028-83753087(质量) 83752193(销售)

传真号码:028-83753077

注册地址:四川省彭州工业开发区柏江北路368号

网址: <http://sczy.yabao.com.cn>